



Peter Weithinger

Bruine rat en zwarte rat

Rattus norvegicus en Rattus rattus

Wat u zelf kunt doen

Het doden van ratten heeft vaak maar tijdelijk effect. Een betere oplossing is om te voorkomen dat ratten uw huis binnendringen.

- Laat geen afval rondslingeren en maak regelmatig schoon onder fornuizen en koelkasten.
- Zorg dat afval in een gesloten afvalbak of container zit. Plaats niets bij een ondergronds inzameldepot.
- Zorg ervoor dat de ratten niet bij diervoer (bijvoorbeeld van hobbykippen of konijnen) kunnen.
- Maak uw huis ontoegankelijk voor ratten: maak gaten groter dan 1 cm dicht en plaats deurborstels onder deuren.
- Ruim overgebleven vogelvoer in de tuin aan het eind van de dag op.
- Beperk het voeren van vogels in de openbare ruimte.
- Zorg ervoor dat al het leidingwerk in goede staat verkeerd: ratten kunnen via kapotte buizen uw huis binnenkomen.

- Als de ratten toch binnen zijn, maak dan gebruik van de in de handel verkrijgbare rattenvallen.

Wat te doen bij ernstige overlast?

Als u een rat ziet meld dit dan bij de gemeente. Met klachten over ratten kunt u terecht bij de gemeente.

Website www.almere.nl
E-mail info@almere.nl
Telefoon 14 036

De bruine- en zwarte rat in Almere

De bruine en zwarte rat zijn echte cultuurvolgers en komen al sinds lange tijd in de buurt van mensen voor. Beide soorten komen oorspronkelijk uit Azië, maar hebben zich inmiddels over de hele wereld verspreid. In Nederland wordt de zwarte rat steeds meer verdrongen door de bruine.

In Almere heersen, net als in veel andere steden, prima condities voor de bruine en zwarte rat om zich thuis te voelen. Vooral bruine ratten komen overal in en om de stad voor. De zwarte rat wordt de laatste jaren weinig gezien in Flevoland.

Herkenning

De bruine rat dankt zijn naam aan de kleur van zijn vacht. De dieren kunnen tot 30 centimeter lang worden waar nog een lange roze staart met een lengte tot 22 centimeter bijkomt. De buikzijde van de bruine rat is lichter van kleur en mannetjes zijn groter dan vrouwtjes.

Aanwezigheid van deze rat kan opgemerkt worden door keutels die 1 tot 2 centimeter lang zijn en daarmee duidelijk groter zijn dan muizenkeutels.

De zwarte rat is met een lichaamslengte tot 24 centimeter kleiner dan de bruine rat en heeft een zwarte vacht. Deze kan echter ook bruin of grijs van kleur zijn. De oren van deze soort zijn kaler dan die van de bruine rat en de staart is langer: net zo lang of iets langer dan zijn lichaam.

Sporen van deze dieren zijn met name de puntige dunne keutels die donker van kleur en ongeveer 1 cm lang zijn. Deze liggen vooral op balken en richels in plaats van op de grond, zoals bij de bruine rat.



Leefgebied

Ratten komen vooral voor in de buurt van mensen. Daar waar het vochtig en donker is, voelt de bruine rat zich in zijn nopjes. In de stad zijn rioleringen, pakhuizen, fabrieken en kelders favoriet bij deze soort. In het buitengebied komen ze ook voor in rietvelden en watergangen in de buurt van agrarisch bouwland. Ze vormen kleine sociale groepen en hebben geen vast territorium, maar bewegen zich voort in een straal van ongeveer 100 meter op zoek naar voedsel.

Zwarte ratten zitten graag op zolderetages van huizen en zijn goede klimmers. Hierdoor zijn ze niet gebonden aan water, zoals de bruine rat. De soort leeft in groepen van 20 tot 60 dieren en iedere groep heeft een territorium dat ze fel verdedigen tegen andere soortgenoten.

Leefwijze

Beide rattensoorten zijn voornamelijk 's nachts actief en vrij schuw van aard. Als je ze niet ziet, wil dat dus niet zeggen dat ze er niet zijn. Ratten maken meerdere holen bestaande uit een gangenstelsel. In de stad maken ratten hun nest ook in spouwmuren en andere holle ruimtes in of dichtbij bebouwing.

Bruine ratten zijn echte alleseters en eten naast gevonden voedsel in de vorm van menselijk afval ook prooien die ze zelf vangen. Ze jagen onder andere op kuikentjes, kikkers en kleine zoogdieren. Zwarte ratten zijn ook alleseters, maar eten voornamelijk plantaardig voedsel.

Zowel de bruine als de zwarte rat kan zich het hele jaar door voortplanten. Vooral in de maanden maart, september en oktober worden veel bruine ratten geboren. Deze soort kan ieder jaar 3 tot 5 nesten produceren met gemiddeld 7 jongen per nest. Ook zwarte ratten krijgen gemiddeld 7 jongen per nest en worden vooral in de periode maart tot en met november geboren. Deze soort kan ieder jaar 3 tot 6 nesten produceren. Omdat ratten knaagdieren zijn, moeten ze hun tanden kort houden en knagen daarom aan alles wat los en vast zit. Hierdoor kan behoorlijke schade ontstaan aan kabels, pvc buizen en isolatiemateriaal. Daarnaast kunnen ze schadelijk zijn voor voedselvoorraden en gewassen.

Beschermingsstatus

Beide rattensoorten zijn niet beschermd en mogen daarom bij schade in huis of aan landbouwgewassen bestreden worden.

Wat doet de gemeente?

De gemeente signaleert en houdt toezicht op meldingen over ratten. Wanneer er een plaag dreigt neemt de gemeente maatregelen.